Éditorial

Avec l'intensification de l'agriculture, l'évolution croissante de la concentration en nitrate des eaux que l'on connaît depuis une vingtaine d'années dans de nombreuses régions françaises est largement médiatisée, surtout en raison de la contrainte que constitue la limite de 50 mg/l fixée pour les eaux alimentaires.

Si tous les partenaires concernés par cette évolution sont d'accord sur l'objectif d'une réduction des rejets et des transferts d'azote dans les eaux naturelles, on doit aujourd'hui prendre acte de l'efficacité limitée des efforts jusqu'alors consentis.

Mais a-t-on fait toute la lumière des effets de cette évolution sur l'ensemble des écosystèmes et n'est-ce pas avoir une vue étroite que de focaliser, même si cela est nécessaire, sur l'exposition au nitrate des populations par l'eau, quand on sait que la consommation de légumes constitue la principale source d'exposition.

Les performances de notre agriculture sont dues pour une part importante à l'amélioration des espèces et à une fertilisation surabondante, mais aussi à un emploi généralisé des pesticides. Cela a des conséquences sur notre environnement.

La contamination des milieux et des denrées alimentaires par plus de 400 molécules de synthèses utilisées dans la formulation des phytosanitaires dont on est loin de connaître l'évolution et toutes les propriétés toxicologiques pose de nombreux problèmes.

Un important effort de recherche doit être fait pour élucider les mécanismes de transfert sol-eau de ces produits en intégrant la diversité des facteurs qu'il convient de prendre en considération. Il s'agit là d'un préalable indispensable pour définir une stratégie fiable de surveillance de la qualité des eaux et surtout des actions de prévention efficace. C'est à ce prix que l'on pourra inverser l'évolution inquiétante des niveaux de contamination des eaux par les pesti-

cides, notamment celle des eaux de surfaces des régions d'agriculture intensive.

Mais il faut souligner que l'on ne fera des progrès significatifs en terme de connaissance de l'exposition des populations aux phytosanitaires que si l'on est capable de surveiller les niveaux de contamination de l'ensemble des voies, et particulièrement celle de l'alimentation.

Les problèmes posés par ces substances sont beaucoup plus complexes que pour l'ion nitrate, car il faut prendre en compte la dégradation des molécules et la toxicité des métabolites.

Si le thème nitrate retenu par les organisateurs de ce colloque a déjà été largement débattu, les questions qui sont abordées autour des phytosanitaires ne constituent sans doute que l'amorce d'une réflexion qui devrait à l'avenir mobiliser de nombreuses énergies. Qu'ils soient félicités de cette initiative.

PROFESSEUR RENÉ SEUX

**Teneurs en nitrate des eaux
souterraines en France**

**État des connaissances en
1993**

Échelle 1 / 1 500 000
0 120 km

Cette carte a été réalisée en 1992 et 1993 au BRGM, Service géologique national, par André Lallemand-Barres (ingénieur hydrologue au BRGM) et Mireille Leteur (ingénieur stagiaire ENSG), sous la direction de Jean-Claude Roux (ingénieur hydrologue au BRGM, chargé de mission eau, mission service public), d'après les données communiquées par les directions départementales des affaires sanitaires et sociales et les agences de l'eau. Elle a été établie sous la maîtrise d'ouvrage du Ministère de l'Environnement (Direction de l'eau) et dans le cadre du réseau national des données, sur l'eau RNDE.

**Figure 1. – Principales nappes libres
du territoire français classées
par type d'aquifère et d'unité de gestion
(J. MARGAT, 1990)**

*Major shallow ground water bodies
of the french territory classified for aquifer
type and management unit
(J. MARGAT, 1990)*